



Tekst en fotos: DirkJan Dekker

Het was op zaterdag 29 oktober Laag Water om 12:37 uur.

De excursie was van 11:30 uur tot 13:30 uur.

Bij half bewolkt tot zonnig weer, een zacht zuidoosten windje en 22°C, wandelden we met ons vijven over het buitendijks gelegen pad vanaf de parkeerplaats bij het Tuttelhoekje naar de Hoek van de Kraag.

In mijn herinnering was er een strandje. Dat was nu geheel bedekt met vele overlappende stroken aanspoelsel.



Het aanspoelsel was zeer gevarieerd

Klein zeegras, Kleine zee-eik, Blaaswier, Gezaagde zee-eik waarop gele Tepelhorentjes, Knotswier.

En jonge struikjes Japans bessenwier, allemaal met hun hechtvoetjes op kleine schelpen. Dit deed me pijn, jong leven gesmoord. Wat deden ze ook op kleine schelpjes, dat is nauwelijks een vaste ondergrond, een beetje storm, en voilà, daar lig je al op de zeedijk. Er lagen tientallen struikjes, allemaal met een schelpje.



Strook aanspoelsel



Klein zee gras



Jonge struikjes Japans bessewier, met schelpjes als "vaste" ondergrond



Voetje van Japans bessewier op een Tapijtschelp

Lager op het strandje lag geen aanspoelsel meer maar vele grote stenen

Te keren stenen met aan de onderkant een veilig onderkomen voor kleine krabbetjes en stekelhorens.

Op een aantal stenen zaten bovenop vele Paardeanemonen in alle maten, vanaf heel klein. Zoiets had ik nog niet eerder gezien. Vergelijk de anemonen maar met de zeepokjes wat grootte betreft.



Nog meer verrassingen

Op de bij eb net onder water staande bodem vonden we Schelpkokerwormen, anemonen en veel roodwiertjes.

Er stond 10cm water boven de zandige bodem. De tentakels van de anemonen staken net boven het zand uit. Op de bodem waren die zichtbaar als witte kransjes.

Onderstaande opnamen van de anemonen zijn onder water genomen.



Deze Schelpkokerworm stak net boven het zand en water uit



Gewone slibanemoon



Gewone slibanemoon. Het monddedeelte is onzichtbaar door het zand



Gewone slibanemoon



Dit is de plek waar we de Gewone slibanemonen en Schelpkokerwormen vonden.

De zuil van Gewone slibanemonen zit tot 10cm in de bodem.

En nog een verrassing

Ik was bezig wat verschillende roodwiertjes in een bakje te verzamelen. Daarbij kwam ik de Schelpkokerworm tegen om te fotograferen. Om mijn handen vrij te hebben, gaf ik het bakje even Kirsten. Zij keek daarin en zag tussen de al verzamelde wiertjes iets geels en opvallends. Wij hadden zo iets nog nooit gezien.

Het bleek een zeenaaktslak te zijn, een Harlekijnslak, een paar cm groot. De slak foerageert op het Harig kantmosdiertje (*Electra pilosa*). En die mosdiertjes zitten veel op wieren. Waarschijnlijk had ik dus wat roodwieren verzameld met mosdiertjes...



Gevonden wieren, in het water en aan de rand ervan

Bloempjeswier, Donker buiswier, Langgerekt knoopwier, Donker knoopwier, Veelvertakt pluimwier, lers mos, Puntig korstmoswier, Vlak geleiwier, Rood hoortjeswier.

Wat voorbeelden van de gevonden wieren en een krab



Bloempjeswier (10cm)



detail van Bloempjeswier



Knoopjes van Langgerekt knoopwier



Veelvertakt pluimwier op Japans bessenwier



Blaasjeskrab (6cm)



Valse oesterdief op kokkels (8cm)



Op een steentje (5cm): Rood hoortjeswier, Veelvertakt pluimwier, Donker buiswier